

97 年度保母人員單一級學科測試參考資料補充修訂對照表

工作項目	題號	原內容	修訂後內容	修訂日期
07	43	下列那些屬於可回收的資源？ A.舊衣服、B.牛奶瓶、C.電池、 D. 保麗龍。 ①ABC②BCD③ABD④ABCD。	下列那些屬於可回收的資源？A.舊衣服、B.牛奶瓶、C.電池、D.圖書。 ①ABC②BCD③ABD④ABCD。	97/6/19
05	1	麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗注射年齡…	刪除	97.09.16
05	77	增題	(1) 呼吸道傳染病的傳染途徑為何？(1)飛沫/空氣(2)糞口(3)血液/體液(4)飲食。	97.09.16
05	78	增題	(3) 下列傳染病何者不是呼吸道傳染病？(1)流感(2)百日咳(3)愛滋病(4)水痘。	97.09.16
05	79	增題	(1) 下列何者不是預防呼吸道傳染病的方法？ (1)安全的性行為(2)避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所(3)注意個人衛生習慣，提昇個人免疫力(4)按時預防接種。	97.09.16
05	80	增題	(2) 下列何種傳染病無疫苗可預防接種？(1)百日咳(2)腸病毒(3)水痘(4)麻疹。	97.09.16
05	81	增題	(4) 下列何者不是流感的症狀？(1)咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛(2)肌肉痛(3)頭痛、發燒(4)皮膚癢。	97.09.16
05	82	增題	(3) 下列何者不是預防流感的方法？(1)按時接種流感疫苗的接種(2)注意個人衛生習慣，提升自我免疫力(3)安全的性行為(4)避免出入人多擁擠的場合。	97.09.16
05	83	增題	(2) 下列何者不是水痘的傳染方式？(1)空氣傳染(2)糞口傳染(3)飛沫傳染(4)皮膚直接接觸水疱液。	97.09.16
05	84	增題	(2) 下列何者為百日咳的傳染方式？(1)空氣傳染(2)飛沫傳染(3)皮膚直接接觸水泡液(4)糞口傳染。	97.09.16
05	85	增題	(1) 下列何者為流感的傳染方式？(1)空氣/飛沫傳染(2)糞口傳染(3)皮膚直接接觸水泡液(4)飲食傳染。	97.09.16
05	86	增題	(4) 百日咳的典型症狀，除了咳嗽會持續至少	97.09.16

			2 週之外，下列何者不是與咳嗽相關的臨床症狀？(1)陣發性咳嗽(2)吸入性哮聲(3)咳嗽後嘔吐(4)皮膚癢。	
05	87	增題	(1) 下列何者為百日咳好發的年齡層？(1)1 歲以下的嬰兒(2)青少年(3)成人(4)65 歲以上老人。	97.09.16
05	88	增題	(4) 如在校園或托育場所內發生傳染病時，則應注意下列何種事情，以預防疫情散播？(A)有疑似症狀者，應立即就醫(B)室內應避免過於擁擠，並保持室內通風及清潔(C)玩具、遊樂設備等共用設施，應停用或隨時消毒。(1)AC(2)AB(3)BC(4)ABC。	97.09.16
05	89	增題	(1) 下列那一項是腸病毒的生物特性？(1)怕含氯漂白水(2)耐強鹼(3)耐高溫(4)抗紫外線。	97.09.16
05	90	增題	(4) 在臺灣，腸病毒在哪個季節活動？(1)春季(2)夏季(3)秋季(4)全年都有。	97.09.16
05	91	增題	(2) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？(1)當天(2)3 到 5 天(3)14 天(4)1 個月。	97.09.16
05	92	增題	(1) 腸病毒可能透過何種途徑傳染？(A)咳嗽打噴嚏(B)接觸腸病毒患者皮膚水泡潰瘍(C)患者糞便。(1)ABC(2)AB(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	93	增題	(2) 什麼人會感染腸病毒？(A)新生兒(B)孕婦(C)小學生。(1)AB(2)ABC(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	94	增題	(3) 得了腸病毒的小孩，傳染力的變化如何？(1)症狀改善後就不會傳染(2)一週後就不會傳染(3)8 到 12 星期後才可能完全無傳染力(4)10 天就不會傳染。	97.09.16
05	95	增題	(4) 學童感染腸病毒時，最好請假多少天，才不會傳染給其他小朋友(1)1 天(2)3 天(3)5 天(4)7 天(含)以上。	97.09.16
05	96	增題	(1) 下列何者是感染腸病毒 71 型的常見症狀與併發症？(A)39°C 以上高燒(B)手足口病(C)嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐等。(1)ABC(2)AB(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	97	增題	(2) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？(1)與疹子同時出現(2)發疹後 3 至 4 天(3)發疹後 1 星期(4)疹子消失後。	97.09.16
05	98	增題	(4) 下列何者不是腸病毒感染併發重的前兆病徵？(1)嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清(2)	97.09.16

			肌抽躍(3)持續嘔吐(4)皮膚癢。	
05	99	增題	(3) 下列何者不是預防感染腸病毒的方法？(1)注意個人衛生習慣(2)避免出入擁擠公共場所(3)清除孳生源(4)提升個人免疫力。	97.09.16
05	100	增題	(3) 正確洗手步驟為(1)沖棒擦(2)搓沖擦(3)濕搓沖棒擦(4)濕搓沖。	97.09.16
05	101	增題	(1) 幼兒感染腸病毒時，應注意什麼？(A)是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵(B)注意第二個病患尤其是嬰幼兒(C)小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手。 (1)ABC(2)AB(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	102	增題	(3) 新生兒感染腸病毒常見的臨床表現有？(A)心肌炎(B)凝血功能異常(C)肝炎。 (1)AB(2)AC(3)ABC(4)BC。	97.09.16
05	103	增題	(2) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？(1)2 到 3%(2)5 到 6%(3)10 到 12%(4)20 到 30%。	97.09.16
05	104	增題	(4) 以一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水配置 10 公升 200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？(1)10cc (2)20cc(3)30cc(4)40cc。	97.09.16
05	105	增題	(2) 臺灣腸病毒流行高峰多出現在每年幾月？(1)3、4月(2)5、6月(3)7、8月(4)11、12月。	97.09.16
05	106	增題	(1) 下列何年齡層為腸病毒感染併發重症高危險群？(1)0 到 5 歲(2)5 到 9 歲(3)10 到 14 歲(4)15 歲以上。	97.09.16
05	107	增題	(4) 容易導致嚴重併發症的最主要腸病毒型別為(1)克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型(2)伊科病毒(Echovirus)第 6 型(3)克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型(4)腸病毒(Enterovirus)71 型。	97.09.16
05	108	增題	(3) 依據歷年監視資料，導致死亡的最主要腸病毒型別為(1)伊科病毒(Echovirus)第 11 型(2)克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型(3)腸病毒(Enterovirus)71 型(4)克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型。	97.09.16
05	109	增題	(2) 在臺灣，小兒麻痺症疫苗常規預防接種時程為？(1)出生滿 1、3、5、15 個月與國小一年級(2)出生滿 2、4、6、18 個月與國小一年級(3)出生滿 3、6、9、18 個月與國小一年級(4)出生滿 4、8、12、16 個月與國小一年級。	97.09.16

05	110	增題	(1)日本腦炎主要症狀是什麼？(A)頭痛(B)發燒(C)無菌腦膜炎(1)ABC(2)AB(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	111	增題	(2)日本腦炎的潛伏期是多久？(1)1 到 3 天(2)5 到 15 天(3)一個月(4)三個月。	97.09.16
05	112	增題	(3)下列哪一種不是台灣傳播日本腦炎的病媒蚊？(1)白頭家蚊(2)環紋家蚊(3)埃及斑蚊(4)三斑家蚊。	97.09.16
05	113	增題	(3)日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？(1)2 至 7 月(2)3 至 8 月(3)5 至 10 月(4)8 月至次年 1 月。	97.09.16
05	114	增題	(4)下列哪一項不是日本腦炎的預防方法？(1)避免蚊蟲叮咬(2)接種日本腦炎疫苗(3)戶外活動穿著長袖長褲(4)黃昏時在豬舍附近散步。	97.09.16
05	115	增題	(1)家中幼兒何時可以接種日本腦炎疫苗？(1)年滿 15 個月(2)年滿一歲(3)出生後滿一週(4)出生後滿 24 小時。	97.09.16
05	116	增題	(4)幼兒日本腦炎疫苗預防接種共需要接種幾劑？(1)1 劑(2)2 劑(3)3 劑(4)4 劑。	97.09.16
05	117	增題	(3)幼兒初次接受日本腦炎疫苗接種二劑，其間應相隔多久？(1)2 小時(2)2 天(3)2 週(4)2 個月。	97.09.16
05	118	增題	(2)幼兒日本腦炎疫苗預防接種最後追加一劑是在什麼時候？(1)幼稚園小班(2)小學一年級(3)小學二年級(4)小學三年級。	97.09.16
05	119	增題	(1)日本腦炎是否會經由人傳染給人？(1)不會(2)會(3)不一定(4)視嚴重程度而定。	97.09.16
05	120	增題	(4)下列哪一項是日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用？(A)局部注射部位紅、腫、痛(B)頭痛、發燒(C)輕微肌肉酸痛。 (1)AB(2)AC(3)BC(4)ABC。	97.09.16
05	121	增題	(2)登革熱的感染方式為何？(1)空氣傳染(2)藉由病媒蚊叮咬人時將病毒傳入人體內(3)接觸傳染(4)飲食傳染。	97.10.01
05	122	增題	(3)下列哪一種不是登革熱的典型症狀？(1)發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)(2)頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛(3)嘔吐(4)出疹。	97.09.16
05	123	增題	(4)下列何者不是預防病媒傳染病的方法？(1)清除孳生源(2)戶外踏青穿著長袖長褲(3)注意居家環境衛生(4)多喝水。	97.09.16
05	124	增題	(2)登革熱的潛伏期有多久？(1)1 到 3 天(2)3 到 8 天(3)15 天(4)30 天。	97.09.16
05	125	增題	(4)感染登革熱以後有無免疫力，下列何者敘述不正確？(1)感染某一型登革病毒患者，對該型病毒具有終身免疫(2)對其他型別僅具有短暫的	97.09.16

			免疫力，通常約為 2-9 個月(3)有可能再感染其他型別(4)感染某一型登革病毒後，對其他型登革病毒都有終身免疫。	
05	126	增題	(3) 登革熱主要病媒蚊埃及斑蚊在台灣的分布？(1)全台灣皆有(2)台中大甲以南(3)嘉義布袋(北回歸線)以南(4)金、馬地區。	97.09.16
05	127	增題	(4) 登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊成蚊吸血習性描述何者為非？(1)有晨昏二個高峰(2)日出前後 1-2 小時和日落前 2 到 5 小時(3)下午高峰較上午高(4)半夜 12 點。	97.09.16
05	128	增題	(3) 登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為幾型？(1)2 型(2)3 型(3)4 型(4)5 型。	97.09.16
05	129	增題	(1) 登革熱病媒蚊孳生源清除主要實施策略？(A)建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管(B)環境整頓、容器減量與孳生源清除(C)督導考核。(1)ABC(2)AB(3)AC(4)BC。	97.09.16
05	130	增題	(3) 下列疫苗何者尚未納入國家常規預防接種項目？(1)B 型肝炎疫苗(2)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(3)輪狀病毒疫苗(4)小兒麻痺疫苗。	97.09.16
05	131	增題	(1) 國內現行的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗第一劑接種時程為(1)出生滿 12-15 個月(2)出生滿 2 歲(3)出生滿 3 歲(4)國小一年。	97.09.16
05	132	增題	(3) 政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象為？(1)所有新生兒(2)所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒(3)高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒(4)65 歲以上老人。	97.09.16
05	133	增題	(3) 下列何種疫苗如與水痘疫苗未同時接種最少要間隔一個月再接種？(1)B 型肝炎疫苗(2)流感疫苗(3)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(4)日本腦炎疫苗。	97.09.16
05	134	增題	(1) 依我國現行之常規預防接種時程，下列何種疫苗非小一學童應接種項目？(1)B 型肝炎疫苗(2)日本腦炎疫苗(3)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(4)小兒麻痺口服疫苗。	97.09.16
05	135	增題	(4) 我國現行常規預防接種時程，幼兒出生滿 6 個月時應接種何種疫苗？(A)B 型肝炎疫苗(B)小兒麻痺疫苗(C)白喉、破傷風、百日咳混合疫苗。(1)A(2)B(3)C(4)ABC。	97.09.16
05	136	增題	(2) 依我國現行常規預防接種時程，白喉、破傷風、百日咳混合疫苗(DTP)接種時程在出生滿	97.09.16

			幾個月接種？(1)2、4、6 及 8 個月大(2)2、4、6 及 18 個月(3)3、5、7 及 9 個月大(4)3、5、7 及 13 個月大。	
05	137	增題	(2) 依我國現行常規預防接種時程，水痘疫苗接種時程在出生滿幾個月接種？(1)10 個月(2)12 個月(3)14 個月(4)18 個月。	97.09.16
05	138	增題	(1) 依我國現行常規預防接種時程，B 型肝炎疫苗在出生後第 2-5 天要接種第一劑，請問第二及第三劑在出生滿幾個月要接種？(1)1 及 6 個月(2)2 及 4 個月(3)3 及 9 個月(4)10 及 12 個月。	97.10.01
05	139	增題	(4) 下列腸道傳染病之敘述，何者不正確？(1)「腹瀉」是旅遊者最普遍、最容易發生的症狀(2)出國旅遊，返國後一月內如出現不適症狀，應主動告知醫師旅遊史及接觸史(3)只要適當治療皆可治癒(4)如有腸胃道疑似症狀，治療中仍可處理食物或照顧小孩。	97.09.16
05	140	增題	(2) 有關腸道傳染病之預防方法，何者不正確？(1)照顧小孩前應確實洗手(2)只要出國前施打疫苗就可以避免，不需特別注意飲食衛生(3)食用充份煮熟之食品(4)不吃路邊攤冰品。	97.09.16
05	141	增題	(1) 下列腸道傳染病之敘述，何者不正確？(1)腸道傳染病之致病原皆為細菌(2)經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染(3)可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播(4)依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。	97.09.16
05	142	增題	(2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？(1)小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然的提高免疫力(2)出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療(3)腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播(4)腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。	97.09.16
05	143	增題	(4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？(1)生食可能感染腸道傳染病，一定要搭配芥末、青蔥或薑等醬料食用，才能完全殺菌確保安全(2)進口的生蠔乾淨無污染，生食沒有感染腸道傳染病的風險(3)山上的野果野莓可能遭到小動物排泄物污染，吃了可能會拉肚子，就近用溪水或泉水清洗才安全(4)避免生食冷飲。	97.09.16

05	144	增題	(4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？ (1)出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心的飲食(2)細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到60°C就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌(3)腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀(4)避免生食冷飲。	97.09.16
----	-----	----	--	----------



「保母人員」職類單一級術科測試參考資料補充修訂對照表

項目	頁	原 內 容	修 訂 後 內 容	修訂日期																																										
第二部分:(應檢參考資料)參、保母人員技術士技能檢定術科測試自備工具表	10	<p>二、調製區：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名稱</th> <th>規 格</th> <th>單 位</th> <th>數 量</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>圍裙</td> <td>連上身</td> <td>件</td> <td>1</td> <td>連上身</td> </tr> </tbody> </table>	項目	名稱	規 格	單 位	數 量	備 註	1	圍裙	連上身	件	1	連上身	<p>二、調製區：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名稱</th> <th>規 格</th> <th>單 位</th> <th>數 量</th> <th>備 註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>圍裙</td> <td>連上身</td> <td>件</td> <td>1</td> <td>連上身</td> </tr> <tr> <td>◎2</td> <td>菜刀</td> <td>中型(不銹鋼製)</td> <td>把</td> <td>1</td> <td>◎本項屬自由攜帶工具</td> </tr> <tr> <td>◎3</td> <td>水果刀</td> <td>中型(不銹鋼製)</td> <td>把</td> <td>1</td> <td>◎本項屬自由攜帶工具</td> </tr> <tr> <td>◎4</td> <td>削皮刀</td> <td>一般家庭用</td> <td>支</td> <td>1</td> <td>◎本項屬自由攜帶工具</td> </tr> </tbody> </table>	項目	名稱	規 格	單 位	數 量	備 註	1	圍裙	連上身	件	1	連上身	◎2	菜刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具	◎3	水果刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具	◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具	97.01.30
項目	名稱	規 格	單 位	數 量	備 註																																									
1	圍裙	連上身	件	1	連上身																																									
項目	名稱	規 格	單 位	數 量	備 註																																									
1	圍裙	連上身	件	1	連上身																																									
◎2	菜刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具																																									
◎3	水果刀	中型(不銹鋼製)	把	1	◎本項屬自由攜帶工具																																									
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具																																									
壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知	2		增列：各區成績達60分(含)以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績在59分(含)以下者，術科測試結果評定為「不及格」。	97.07.08																																										
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表(二)	5	第13項奶瓶夾不銹鋼製1支	第13項奶瓶夾不銹鋼製或PP材質1支	97.07.08																																										
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表(三)	7		增列立地式三層置物架1座，放置物品用(本項亦可以幼兒用桌子替代)	97.07.08																																										
陸、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表(五)評值項目一之11之(3)	39	應檢人將圖片、垃圾桶、防滑椅歸位。	應檢人將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	97.07.08																																										
玖、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表	62		如62頁附表	97.07.08																																										